

## Balstvakcinācija pret Covid-19 ar pielāgotajām vakcīnām



Vakcinācijas algoritms ir vienkāršs – vienas balstvakcinācijas princips

Vakcināciju var saņemt savā ģimenes ārsta praksē vai ārstniecības iestādes vakcinācijas kabinetā

### Kad vakcinēties ar pielāgoto vakcīnu?

**3 mēnešus** pēc pēdējās oriģinālās vakcīnas saņemšanas – cilvēkiem no 65 gadu vecuma un imūnsupresētiem cilvēkiem

**6 mēnešus** (bet ne agrāk kā 3 mēnešus) pēc pēdējās oriģinālās vakcīnas saņemšanas – visiem pārējiem iedzīvotājiem

**4–6 mēnešus** (bet ne agrāk kā 3 mēnešus) pēc pārslimošanas ar Covid-19

### Vakcinācija ir rekomendējama visai sabiedrībai, bet jo īpaši:

- imūnsupresētiem cilvēkiem un viņu ciešām kontaktpersonām
- ilgstošiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem un to aprūpes personālam
- senioriem vecumā no 65 gadiem
- veselības aprūpes personālam
- cilvēkiem ar hroniskām slimībām
- grūtniecēm

### Vakcinācijas devu skaits\*

Iepriekš saņemtās Covid-19 vakcīnas devas	0 devas	1 deva	2 devas un vairāk
Jāsaņem pielāgotās Covid-19 vakcīnas	2 devas	1 deva	1 deva

\*Pārslimošanas fakts NETIEK pielīdzināts vienai vakcīnas devai